Contans® WG

Mode d'emploi

■ Généralités
Le produit a pour base des conidies (spores de champignons) du champignon terrestre *Coniothyrium minitans*. Un gramme de produit contient au moins 1 x 10^9 de spores vivants. Contans WG détruit la phase sclérotique de la maladie *Sclerotinia sp*. dans le sol.

■ Domaine d'application
Le produit est appliqué par pulvérisation avant ou simultanément par l'incorporation au travail du sol avec une fraise ou herse à une profondeur de 5 à 10 cm. Après le traitement, il ne devrait plus y avoir de travaux en profondeur afin de ne pas ramener des gravats pollués vers la surface. Ne pas appliquer le produit lors de sécheresse. Plus l'enfouissement sera profond, plus la quantité sera importante.

Moment de l'application
Contans WG donne son plein effet après 2 à 3 mois; de ce fait les plantations de courte durée de végétation (ex. salades) ne seront protégées que partiellement. A l'inverse celles de longue durée de végétation (ex. céleri) seront protégées suffisamment. En présence de sols fortement contaminés, il y a lieu de répéter le traitement.

Stratégie A (avant la culture)
Le sol sera traité avant le semis/plantation avec Contans WG. Après ce traitement, seuls des travaux légers du sol seront pratiqués.

Stratégie B (après récolte)
Le sol contaminé sera traité avec Contans WG après la récolte afin d'agir sur les résidus de récolte et sur les sclérotes qui jonchent le sol. L'intervention se fera avant la préparation du lit de semences/plantation de la culture suivante.

Cultures maraîchères
Salade, chicorée, courgettes, poivrons, céleri, carottes, choux, tomates, haricots
4-8 kg / ha dans 500-1000 lt d'eau.

Tabac
4-8 kg / ha dans 500-1000 lt d'eau.

Grandes cultures
Colza, tournesol, soja
2-8 kg / ha dans 500-100lt d'eau.

■ Délai d'attente
Aucun

■ Préparation de la bouillie
Contans WG doit être brassé au moins 5 minutes avec une eau inférieure à 15 C°(brasseur).

■ Miscibilité
Ne pas mélanger avec des fongicides.
Herbicides: mélangeable avec Devrinol Combi. Des mélanges avec des produits contenant de la Trifluralin doivent être appliqué et incorporée dans les 1,5 heures. Une application ultérieure avec des produits à base de Clomazone comme Devrinol Top, Brasan ou Nimbus peuvent atténuer l'efficacité. Pour d'autres mélanges, demandez conseils chez Andermatt Biocontrol SA.

■ Manipulation
Ne pas manger, boire ou fumer sur sa place de travail.
Après le travail, laver les mains avec de l'eau et du savon.
Aérer suffisamment.

■ Premier secours
Après inhalation:
En cas des problèmes, consulter un médecin.
Après un contact avec la peau:
Bien nettoyer les parties concernées avec de l'eau et du savon.
Après un contact avec les yeux:
Rincer les yeux à l'eau courante (en écartant bien les paupières).Si les troubles persistent, consulter un médecin.
Après ingestion:
Pas de symptômes connu

■ Transport
Pas de réglementation

■ Stockage
Contans WG doit être stocké impérativement en dessous de 4 C°, dans ce cas la conservation est d'au moins 6 mois.
Conserver à -18℃ au moins 12 mois.

■ Elimination
Emballages: Les emballages vides doivent être nettoyés soigneusement et déposés dans une décharge.

■ Responsabilité
Andermatt Biocontrol SA décline toute responsabilité en cas de dégâts aux cultures dus au non respect des recommandations d'emploi.